

	Transfusion sanguine	TRANSFUSION PRE-HOSPITALIERE	transfusion pre-hospitaliere protocole.docx
			Rév 0
			1 / 2

Objectif	Protocole médical d'organisation d'une transfusion sanguine préhospitalière
Champ d'application	SAMU-SMUR
Responsable pour application	Médecins SMUR - médecin régulateur
Critères HAS	25a - Prise en charge des urgences et des soins non programmés; 8j - Maîtrise du risque transfusionnel
Processus	13 - Prise en charge des urgences et des soins non programmés
Documents qualité interne associés	Manuel de transfusion sanguine
Références documentaires et réglementaires	<ul style="list-style-type: none"> • Transfusion de CGR – Recommandations HAS novembre 2014
Méthode d'évaluation de l'application	
Définitions et abréviations	CGR : culot de globule rouge PFC : plasma frais congelé

Rédaction : Dr REMY, hémovigilant	Validation : Dr JACQUET, responsable SMUR Dr LEGOF, responsable de l'UMT biologie médicale M. LEPERS, cadre de santé des urgences	Conformité documentation qualité : S. BOUSSEMAERE, directeur qualité Septembre 2016
---	---	---

Suivi des modifications et des évolutions	<i>Indice de révision – date – motif de révision</i>
--	--

MEDECIN REGULATEUR :

- Appelle le laboratoire au 3100
- Commande **2 CGR** (exceptionnellement jusqu'à 4 CGR si intervention éloignée, délai de route important)
 - O négatif : femme en âge de procréer
 - O positif : homme et femme > 50 ans
- Possibilité de demander **2 PFC AB** max mais délai incompressible de 30min pour sortir du labo
- Donne son nom au technicien pour valider la prescription téléphonique
- Demande à un aide-soignant des urgences d'aller chercher au laboratoire la mallette de transport contenant les produits sanguins et le matériel de transfusion

MEDECIN SMUR :

- Réalise la transfusion
- Remplit la fiche de distribution nominative et retourne l'original avec la prescription papier au laboratoire à son retour d'intervention
- Conserve une copie dans le dossier patient
- Si les poches sont non transfusées et laissées dans l'établissement de destination en informer le laboratoire du CHIVA
- Si les poches sont non utilisées les ramener au laboratoire du CHIVA pour destruction
- Fait rapporter la mallette de transport au laboratoire à son retour d'intervention